

Россия: данные по гепатиту С¹

Эпидемиология

| Показатель | Значение | Источник информации |
|---|--------------|---|
| Распространенность | 4% | Отчет «Коалиции по готовности к лечению» http://itpcru.org/2015/08/03/lechenie-gepatita-s-v-rf-staroe-novoe-nedostupnoe/ |
| Бремя заболевания (оценочные данные) | 5-5,8 млн. | По данным референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами Роспотребнадзора |
| Оценочная распространенность ВГС среди ЛЖВ | Не менее 27% | Не менее 200 000 зарегистрированных пациентов; по официальным данным, полученным из учреждений здравоохранения 45 субъектов РФ |
| Оценочная распространенность ВГС среди ЛУИН | 69% | Отчет «Фонда имени Андрея Рылькова» http://en.rylkov-fond.org/wp-content/uploads/2014/07/ARF-HCV-report-2013-final_eng.pdf |
| Основные группы риска | ЛУИН | Отчет «Фонда имени Андрея Рылькова» http://en.rylkov-fond.org/wp-content/uploads/2014/07/ARF-HCV-report-2013-final_eng.pdf |

Лечение гепатита С

| | |
|----------------------------------|--|
| Текущий стандарт лечения: | PEG-IFN/RBV, для генотипа 1 рекомендована тройная терапия с использованием ПППД |
| Стоимость лечения: | От 88 долларов за ампулу PEG-IFN, от 10 000 до 15 000 долларов за курс терапии с ПППД на коммерческом рынке и в рамках программ лечения |
| Национальная программа: | Из разных источников на закупку препаратов выделяется не менее 50 миллионов долларов США |
| Клинические протоколы: | 2014 год |
| Донорские программы: | Сведения отсутствуют |
| Доступ к ПППД второго поколения: | Зарегистрированы даклатасвир, асунапревир, омбитасвир/паритапревир/ритонавир + дасабувир, симепревир Ограниченное количество закупается в рамках различных программ лечения |

Возможные направления работы по расширению доступа:

- Инициация принятия национальной программы по профилактике и лечению вирусных гепатитов (с фокусом на ВГС) с учетом потребностей уязвимых групп
- Содействие принятию реестра пациентов с ВГС
- Регистрация новых ПППД и снижение цен на них
- При необходимости - устранение патентных барьеров для улучшения доступа к препаратам.

¹ При подготовке документа использовались данные отчета «Гепатит С в странах Восточной Европы и Центральной Азии: эпидемия и ответные меры» Международного Альянса по ВИЧ/СПИДу в Украине и ИТРСги. Данные приведены на конец сентября 2015 года